

Registro de Dosis

Para IBRANCE® (palbociclib) + Fulvestrant

Fecha de inicio de mi IBRANCE en este ciclo: _____ Dosis de mi IBRANCE: _____
 día | mes | año

Registre su fecha de inicio y marque cada día que tome su tratamiento.

Esta es su lista de verificación:

- Registre el día en que comienza a tomar IBRANCE e informe al equipo de atención médica su fecha de inicio.
.....
- Semanas 1-3 (Días 1-21), tome IBRANCE. Semana 4 (Días 22-28), no tome IBRANCE. Asegúrese de seguir su esquema de dosificación exactamente como le indique su equipo de atención médica.
.....
- Marque sus dosis de IBRANCE diarias.
.....
- Registre los días en que recibe sus inyecciones de fulvestrant.
.....
- Imprima un nuevo registro cada vez que inicie un ciclo y registre cualquier cambio en la dosis.
.....
- Recuerde volver a surtir su receta de IBRANCE a tiempo y siempre siga las instrucciones de su equipo de atención médica.

DÍA DE LA SEMANA							
SEMANA UNO IBRANCE							
SEMANA DOS IBRANCE							
SEMANA TRES IBRANCE							
SEMANA CUATRO							
NO TOME IBRANCE							

Consulte la Indicación y la Información de Seguridad Importante en la página 2.
 Haga clic para acceder a la [Información de prescripción completa](#) y la [Información del paciente](#) o visite IBRANCE.com.



Indicación

IBRANCE® (palbociclib) cápsulas y comprimidos de 125 mg es un medicamento de prescripción indicado en adultos para el tratamiento del cáncer de mama con receptores hormonales positivos (HR+) y con receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-), que se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico), en combinación con fulvestrant en personas cuya enfermedad ha progresado después de una terapia hormonal. Se desconoce si IBRANCE es seguro y eficaz en niños.

Información de Seguridad Importante

IBRANCE puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

Recuentos bajos de glóbulos blancos (neutropenia). Los recuentos bajos de glóbulos blancos son muy frecuentes cuando se toma IBRANCE y pueden causar infecciones graves que pueden provocar la muerte. Su proveedor de atención médica debe verificar sus recuentos de glóbulos blancos antes y durante el tratamiento.

Si presenta recuentos bajos de glóbulos blancos durante el tratamiento con IBRANCE, su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento, disminuir la dosis o indicarle que espere para comenzar el ciclo de tratamiento. Comuníquese de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta signos y síntomas de recuentos bajos de glóbulos blancos o de infecciones, como fiebre y escalofríos.

Problemas pulmonares (neumonitis). IBRANCE puede provocar una inflamación de los pulmones grave o potencialmente fatal durante el tratamiento y puede conducir a la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o si sus síntomas empeoran, que incluyen:

- dolor de pecho
- tos con o sin flema
- dificultad para respirar o falta de aire

Su proveedor de atención médica puede interrumpir o detener por completo el tratamiento con IBRANCE si sus síntomas son intensos.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar IBRANCE?

Antes de tomar IBRANCE, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

- tiene fiebre, escalofríos o cualquier otro signo o síntoma de infección.
- tiene problemas hepáticos o renales.
- está embarazada o planea embarazarse; IBRANCE puede hacer daño a su bebé por nacer.
 - **Las mujeres** con capacidad de quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y, como mínimo, durante 3 semanas después de tomar la última dosis de IBRANCE. Es posible que su proveedor de atención médica le pida someterse a una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con IBRANCE.
 - **Los hombres** que tengan parejas del sexo femenino que puedan quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con IBRANCE y, como mínimo, durante 3 meses después de tomar la última dosis de IBRANCE.
- está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si IBRANCE se excreta en la leche materna. No amamante mientras esté en tratamiento con IBRANCE ni durante 3 semanas después de tomar la última dosis.

Los efectos secundarios más frecuentes de IBRANCE incluyen:

- Recuentos bajos de glóbulos rojos y recuentos bajos de plaquetas. Llame inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta alguno de estos síntomas durante el tratamiento:
 - mareos
 - falta de aire
 - debilidad
 - sangrado o aparición de moretones más fácilmente
 - sangrados nasales
- infecciones
- cansancio
- náuseas
- dolor en la boca
- anomalías en los análisis de sangre hepáticos
- diarrea
- debilitamiento o caída del cabello
- aumento de la creatinina en sangre

IBRANCE puede causar problemas de fertilidad en los hombres. Esto puede afectar su capacidad de engendrar un hijo. Si esto le preocupa, antes de tomar IBRANCE hable con su proveedor de atención médica sobre sus opciones de planificación familiar.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene efectos secundarios que le molestan o no desaparecen.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IBRANCE. Llame a su médico para que le asesore sobre los efectos secundarios.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. IBRANCE y otros medicamentos pueden afectarse mutuamente, causando efectos secundarios.

Conozca todos los medicamentos que toma. Tenga una lista de dichos medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

No beba jugo de toronja ni coma productos a base de toronja mientras toma IBRANCE, ya que pueden aumentar la cantidad de IBRANCE en la sangre.

Informe a su proveedor de atención médica si comienza a tomar un nuevo medicamento. Tome IBRANCE exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

Cuando se utilice IBRANCE en combinación con un inhibidor de la aromatasa o fulvestrant, lea también la Información para el paciente sobre los productos prescritos.

Haga clic aquí y consulte la [información de prescripción completa](#) de IBRANCE y la [información para el paciente](#). O visite IBRANCE.com.