

# ¿Está considerando el uso de IBRANCE® (palbociclib)?

Estas preguntas pueden ayudar a iniciar la conversación con su equipo de atención médica:

- ¿Cuáles son mis opciones para tratar el cáncer de mama metastásico?

---

---

---

---

- ¿Cómo actúa IBRANCE?

---

---

---

---

---

- ¿Por qué IBRANCE se toma con un inhibidor de la aromatasa\* o fulvestrant?

---

---

---

---

---

El inhibidor de la aromatasa\* es una clase de tratamiento que incluye: letrozol, anastrozol y exemestano.

## Indicaciones

IBRANCE en cápsulas o comprimidos de 125 mg es un medicamento que se vende bajo receta médica y se utiliza en adultos para el tratamiento del cáncer de mama positivo para el receptor hormonal (HR+) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2-) que se ha propagado a otras partes del cuerpo (metastásico), en combinación con:

- un inhibidor de la aromatasa como primer tratamiento hormonal en mujeres posmenopáusicas o en hombres, o
- fulvestrant en personas con progresión de la enfermedad tras el tratamiento hormonal.



Consulte la Información de Seguridad Importante en la página 4. Haga clic en la [Información para Prescribir Amplia](#) y en la [Información para el Paciente](#) o visite [IBRANCE.com](http://IBRANCE.com).

# ¿Está considerando el uso de IBRANCE® (palbociclib)?

Estas preguntas pueden ayudar a iniciar la conversación con su equipo de atención médica:

- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento?

---

---

---

---

- Si me recetaron IBRANCE, ¿hay algún estudio que deba hacerme?

---

---

---

---

- ¿Qué necesito saber sobre IBRANCE?

---

---

---

---

- ¿Cuánto tiempo tengo para tomar una decisión sobre mi tratamiento?

---

---

---

---



Consulte la Información de Seguridad Importante en la página 4. Haga clic en la [Información para Prescribir Amplia](#) y en la [Información para el Paciente](#) o visite [IBRANCE.com](http://IBRANCE.com).

# ¿Está considerando el uso de IBRANCE® (palbociclib)?

Estas preguntas pueden ayudar a iniciar la conversación con su equipo de atención médica:

- ¿Dónde puedo encontrar apoyo para mí y mi familia?

---

---

---

---

- ¿Conoce usted algún recurso de ayuda con apoyo financiero para IBRANCE?

---

---

---

---

- ¿Cuáles son los próximos pasos?

---

---

---

---

# Información de Seguridad Importante

**IBRANCE® (palbociclib) puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

## **Cantidad baja de glóbulos blancos (neutropenia).**

Es muy frecuente tener una cantidad baja de glóbulos blancos cuando se toma IBRANCE y esto podría causar infecciones graves que pueden provocar la muerte. Su médico debe verificar su cantidad de glóbulos blancos antes y durante el tratamiento.

Si presenta una cantidad baja de glóbulos blancos durante el tratamiento con IBRANCE, el médico puede interrumpir el tratamiento, disminuir la dosis o indicarle que espere antes de comenzar el ciclo de tratamiento. Comuníquese de inmediato a su médico si presenta signos y síntomas de cantidades bajas de glóbulos blancos o de infecciones, como fiebre y escalofríos.

**Problemas pulmonares (neumonitis).** IBRANCE puede causar inflamación grave de los pulmones durante el tratamiento, lo cual puede provocar la muerte. Informe de inmediato a su médico si presenta algún síntoma nuevo o síntomas que empeoran, entre ellos:

- dificultad para respirar o falta de aliento
- tos con o sin flemas
- dolor en el pecho

**Su médico puede interrumpir o suspender por completo el tratamiento con IBRANCE si sus síntomas son graves.**

**Antes de tomar IBRANCE, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:**

- tiene fiebre, escalofríos o cualquier otro signo o síntoma de infección;
- tiene problemas hepáticos o renales;
- está embarazada o planea embarazarse; IBRANCE puede hacerle daño al feto.
  - **Las mujeres** con capacidad de quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y como mínimo durante 3 semanas después de la última dosis de IBRANCE. Es posible que el médico le pida que se realice una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con IBRANCE.
  - **Los hombres** que tengan parejas femeninas que pudieran quedar embarazadas, deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con IBRANCE y como mínimo durante 3 meses después de la última dosis de IBRANCE.

- está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si IBRANCE se excreta en la leche materna. No amamante durante el tratamiento con IBRANCE ni durante 3 semanas después de la última dosis.

**Los efectos secundarios más frecuentes de IBRANCE incluyen:**

- Cantidad baja de glóbulos rojos y de plaquetas. Llame de inmediato a su médico si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento:
  - mareos
  - falta de aliento
  - debilidad
  - sangrado o formación de moretones con más facilidad
  - sangrado nasal
- infecciones
- cansancio
- náuseas
- llagas bucales
- anomalías en las pruebas de función hepática
- diarrea
- caída o pérdida del cabello
- vómitos
- sarpullido
- pérdida del apetito

IBRANCE puede causar problemas de fertilidad en los hombres. Esto puede afectar su capacidad de engendrar un hijo. Hable con su proveedor de atención médica sobre las opciones de planificación familiar antes de iniciar el tratamiento con IBRANCE si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IBRANCE. Para obtener más información, consulte a su médico.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. IBRANCE y otros medicamentos pueden afectarse mutuamente, causando efectos secundarios.

No beba jugo de toronja ni coma productos a base de toronja mientras toma IBRANCE, ya que pueden aumentar la cantidad de IBRANCE en la sangre.

Informe a su médico si comienza a tomar un medicamento nuevo. Tome IBRANCE exactamente como se lo indique su médico.

Si llega a tomar una dosis demasiado alta de IBRANCE, llame de inmediato a su médico o acuda al servicio de urgencias del hospital más cercano.

Haga clic en la [Información para Prescribir Amplia](#) y en la [Información para el Paciente](#) o visite [IBRANCE.com](http://IBRANCE.com)